

01.10.2017

KULLANMA KLAVUZU

POLISORB Mineral Bazlı Gastrointestinal Detoksifiyer

Polisorb'u kullanmadan önce lütfen bu talimatı dikkatlice okuyunuz. Bu kullanım talimatını saklayınız. Tekrar okumanız gerekebilir.

Polisorb nedir ve ne için kullanılır?

Polisorb aşağıdaki durumlarda kullanılır;

- Çocuk ve yetişkinlerde çeşitli sebeplerden kaynaklanan diyarelerde (akut enfeksiyonlar, gıda kökenli intoksikasyonlar) kullanılır,
- Mide bulantısı ve kusma, mide gazı, çocuk ve yetişkinlerde karın ağrısı,
- Çocuk ve yetişkinlerde gıda ve ilaç kökenli alerjik durumlarda (gastrointestinal sistem ve deri üzerindeki semptomların hafifletilmesine sebep olur),
- Çocuk ve yetişkinlerde glutensiz diyet bozukluğu semptomlarının (karın ağrısı, diyare, bulantı ve kusma, dermatit) hafifletilmesine yardımcı olur.

Polisorb, 300 mg/g adsorbsiyon gücü kapasitesine sahip olan anorganik, seçici olmayan çok fonksiyonlu bir adsorbenttir. Bu nedenle, Polisorb mükemmel madde bağlama ve detoks özelliklerine sahiptir. Gastrointestinal yolunda Polisorb bakteri, virüs, toksin, alerjen veya başka toksik maddeler gibi gıda ile birlikte vücuda alınmış ya da vücut tarafından üretilen ve yüksek moleküler ağırlığına sahip olan ve diyareye sebep olabilen maddeleri bağlayabilmektedir. Polisorb toz şeklindedir ve su ile karıştırılarak kullanılmalıdır. Polisorb vücut tarafından emilmemektedir ve değişmeden vücuttan atılmaktadır. Bağlanan maddelerle birlikte vücuttan doğal yol ile dışarı atılmaktadır.

İçindekiler;

Aktif madde: Silikon dioksit (yüksek ölçüde dağılmış şekilde). Polisorb içindeki aktif madde; çalışma mekanizması mekanik olan bir mineral maddedir. Çok yüksek bir yüzey gerilimi olduğu için kendisine büyük miktarda zararlı maddeyi bağlayabilir.

Kullanım şekli;

Polisorb su içerisinde karıştırıldıktan sonra içilmelidir. İçimi kolay olan nötr tatlı süspansiyonu şekline ulaşana kadar karıştırılması gereken toz miktarı su içerisine ilave edilir. Süspansiyon her zaman taze olarak hazırlanmalı ve yemeklerden 1 saat önce veya yemeklerden 1 saat sonra kullanılmalıdır (eşzamanlı ilaç alınırken – diğer ilacı kullanmadan 2 saat önce veya diğer ilacı kullandıktan 2 saat sonra alınmalıdır). Hazırlanan süspansiyon 24 saat içerisinde tüketilmelidir.

Bulantı ve kusma, diyarenin tedavisi : İlk gün Polisorb günde 5 defa alınmalıdır, takip eden günlerde semptomatik iyileşmeye ulaşana kadar günde 3-4 defa kullanılmalıdır.

Alerji tedavisi : Polisorb 10-14 gün boyunca günde 5 defa alınmalıdır.

Önerilen dozlar :

Vücut ağırlığı	Tek doz *	Tek doz için gereken su miktarı	Önerilen günlük miktar*
11'den 20 kiloya kadar	1 gr	50 ml	3 gr
21'den 30 kiloya kadar	1,5 gr	70 ml	4,5 gr
31'den 40 kiloya kadar	2 gr	100 ml	6 gr
41'den 60 kiloya kadar	3 gr	100 ml	9 gr
61'den 80 kiloya kadar	4 gr	150 ml	12 gr
> 80 kilodan fazla	5 gr	150 ml	15 gr

* 1 gr Polisorb tatlı kaşığına eşittir.

Dozaj Hakkında ek bilgi :

Yetişkinler için önerilen günlük doz : 1 kilo vücut ağırlığı için 0,1 'den 0,2 grama kadar,
Azami günlük doz : 1 kilo vücut ağırlığı için 0,33 gr.

Önemli bilgi :

Diyareniz varsa kaybedilen sıvıyı tekrar kazandırmak için bol su içmeniz gerekir. 1 ile 6 yaş arasındaki çocuklar doktora danıştıktan sonra, elektrolit ve sıvı kaybını gidermek için oral solüsyonla birlikte Polisorb'u kullanmaları gerekir. Polisorb, 1 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Diyareniz 3 günden fazla sürüyorsa ya da diyareniz kanlı oluyorsa ve ateşiniz varsa ya da aşırı ağrı ve kramp çekiyorsanız mutlaka doktora danışmanız gerekir. Hamile ya da emziren kadınlar Polisorb kullanmadan önce doktorunuza danışmanız gerekmektedir. Polisorb'u 14 günden fazla kullanmayın çünkü vitamin ve kalsiyum emilimini azaltabilir. Polisorb'u kullanırken ek olarak diyetinizin dengeli besleyici madde ve vitamin içerikli olmasına özen gösterin.

Yan etkileri :

Ender Olanlar : Kabızlık, alerjik reaksiyonlar,

Çok ender olanlar: Silikon dioksitin uzun süreli kullanımı sırasında silisyum içeren böbrek taşı oluşumu

Diğer ilaçlarla etkileşimi :

Polisorb ile aynı anda diğer ilaçları almamaya özen gösterin. Polisorb ve diğer ilaçların kullanımı arasında en az 2 saatin geçmesi gerekir. Çeşitli ilaçların Polisorb ile etkileşimi hakkında daha fazla bilgiyi almak için doktorunuza danışın.

Kontendikasyonlar :

Aşağıdaki durumlarda Polisorb'u kullanmayın;

- Kanayan mide veya bağırsak ülseri
- Gastrointestinal yolun kanaması
- Bağırsak Felci
- Silikon dioksitine karşı aşırı hassasiyet.

Polisorb Nasıl Saklanmalıdır?

2 ° C ve 30 ° C arasında saklayınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.

Açılan ambalajı lütfen sıkı kapalı şekilde tutunuz ve nemden koruyunuz. Bu medikal ürün son kullanım tarihi geçtikten sonra kullanılmamalıdır.

Paket içeriği:

Vücut ağırlığına göre bireysel dozajlı 25 gramlık ambalaj.

Üretici

JSC POLİSORB

TOMSKAYA STREET 14, KOPEİSK, 456652 CHELYABİNSK, RUSYA,